

Szczepienia przed podróżą

Przeciw czemu?	szczepionka	Liczba dawek	Dawki przypominające
Błonica, tężec, krztusiec	Boostrix	1 dawka	co 10 lat
Błonica, tężec, krztusiec, polio	Boostrix Polio	1 dawka	co 10 lat
Żółta gorączka	Stamaril	1 dawka podskórnie; co najmniej 10 dni przed wyjazdem	odporność wieloletnia (wg WHO)
zakażenia meningokokowe (A,C,W-135,Y)	Nimenrix	1 dawka domięśniowo; 10-14 dni przed wyjazdem	odporność wieloletnia
zakażenia meningokokowe (B)	Bexsero		
Dur brzuszny	Typhim VI	1 dawka domięśniowo 10 dni przed wyjazdem	
WZW typu A	Havrix adult Havrix Junior	2 dawki domięśniowo: 0, 6-12 miesiąc; pierwsza dawka 2-4 tygodnie przed wyjazdem	
WZW typu B	Engerix	3 dawki domięśniowo: 0, 1 miesiąc, 6 miesiąc; co najmniej dwie dawki 2 tygodnie przed wyjazdem	
WZW typu A i B	Twinrix	3 dawki domięśniowo: 0, 1 miesiąc, 6 miesiąc; co najmniej dwie dawki	

		2 tygodnie przed wyjazdem	
Wścieklizna	Verorab	3 dawki domięśniowo: 0, 7 dzień, 21 (lub 28) dzień podane przed wyjazdem + dawka uzupełniająca po 12 miesiącach	Co 5 lat
cholera	Dukoral (doustna) lub 1 dawka Vaxchora	2 dawki doustnie: 0, 1-6 tydzień; co najmniej 1 tydzień przed wyjazdem	Co 2 lata
japońskie zapalenie mózgu	Ixiaro	2 dawki domięśniowo: 0, 7 (lub 28) dzień co najmniej 1 tydzień przed wyjazdem + dawka uzupełniająca po 12-24 miesiącach	brak informacji o konieczności dawek przypominających
kleszczowe zapalenie mózgu	FSME FSME junior	3 dawki domięśniowo: 0, 1-3 miesiąc, 5(9)-12 miesiąc; co najmniej dwie dawki podane przed sezonem aktywności kleszczy	co 3-5 lat
Grypa	Vaxigrip Tetra		Raz w roku
Odra, świnka, różyczka	Priorix		